

Ureaphar

Ošetření suché, drsné pokožky, podpora hojení, iritace kůže. Doplněk k lokální léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky.

Carbopolový gel s ureou a dexpanthenolem



Tinctura s triamcinolonem

Léčivá látka triamcinolon má silný protizánětlivý a protisvědivý účinek. Psoriasis vulgaris, svědivé dermatózy, seboroická dermatitida (nebo také seboroická dermatitida nebo seborrhea), na ložiska ekzému.

Triamcinoloni acetonidum 0,02g Acidum salicylicum 0,2g Carbethopendecini bromidum (Septonex) 0,005g Ethanolum 60% 9,78g

Dexalphar

Bílá mast. Používá se na zánět zubních krčků a aftů. Stomatologikum, lokální kortikoid. Možné použití i v dermatologii – na akutní ekzémy a dermatitidy (seboroická, solární, toxická, po ozáření, psoriáza)

Dexamethason acetas 0,005 g masťový základ ad 5,0 g

Nizophar

Léčba kožních infekcí způsobených plísněmi nebo kvasinkami (dermatomykózy), které mohou postihnout kůži trupu, třísel, bérků, rukou nebo nohou. Seboroický zánět kůže (seboroická dermatitida), pityriasis versicolor

Ketoconazol 0,30 g Cremor basalis 14,70 g

Salicylový líh 2%

Změkčení krust na těle a ve kštici, acne vulgaris, seboroická dermatitida aj.

Acidum salicylicum 2,0 g Ethanol 60% 98,0 g