



magistraliter
pharma

Novinky

březen 2015

Vážení obchodní partneři,

v novém roce za Vámi přicházíme s řadou novinek ze sortimentu IPLP. S novými položkami v našem sortimentu a recepturami Vás budeme seznamovat prostřednictvím našich E-Novinek, které budou aktualizovány a doplňovány v reakci na Vaše podněty a připomínky.

Záleží nám na Vaší spokojenosti!

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Magistraliter pharma tým


10g

Viskózní roztok s latanoprostem

Latanoprost působí přímo ve vlasových folikulech, jejich stimulací prodlužuje růstovou fázi. Indukuje růst řas a pomocných chloupků v řasové oblasti oka a kolem očních víček. Projevují účinku zahrnují zesílení a prodloužení řas, zvýšení hustoty a růst dalších řádků řas. Viskózní roztok se aplikuje štětečkem 1x denně v tenké vrstvě ke kořínkům řas a obočí. Uchovává se při 2–8 °C. Vázán lékařským předpisem.

Latanoprost 0,0005 g Polysorbatum 20 0,3 g Carmellosum natricum 0,15 g Aq. conservans ad 10,0 g.


10g

Ušní kapky s gentamicinem a betamethasonem

Vodně alkoholický roztok obsahující kombinaci dvou léčivých látek – antibiotika a kortikosteroidu. Doporučuje se pro léčení lézí v zevním zvukovodu (u akutního a chronického zánětu zvukovodu). Kapky jsou vázány lékařským předpisem a lze je považovat za náhradu za již nedostupný přípravek Garasone.

Betamethason dipropionas 0,01 g Gentamicini sulfas 0,05 g Propylenglycolum 0,5 g Alcohol isopropylicus 3,0 g Aqua purificata ad 10,0 g.


10g

Antibiotická mast

Infikovaná menší poranění (škrábnutí, odření kůže, drobné rány a spáleniny), vředy, povrchové pyodermie (impetigo vulgaris, impetigo Bockhardt, folikulitida, sycosis staphylogenes), vegetující pyodermie, furunkl, eczema microbiale, eczema retroauriculare, eczema nummulara, paratraumatický ekzém, impetiginizované dermatózy, dekubity, intertrigo nekvasinového původu, acne varioliformis, abscesy. Přípravek je vázán lékařským předpisem. Lze ho považovat za možnou náhradu Framykoinu.

Neomycini sulfas 0,05 Erythromycin 0,11 Adeps lanae 2,30 Alcohol cetyllicus 0,20 Paraffinum liquidum 0,10 Cera alba 0,25 Vaselinum album ad 10,0 g.

100g

Nystatinový gel 100 000 m.j./g

Lokální antimykotikum vhodné pro infekce způsobené kandidami. Lokální forma je vhodná k profylaxi a léčbě slizničních kandidóz. Perorálně se aplikuje u ezofageálních a střevních kandidóz. Uchovává se při 2–8 °C. Chránit před světlem. Vázán lékařským předpisem.

Nystatinum 10 mil. m. j. Methylcellulosum 4,2 g Glycerolum 85 % Aqua purificata ad 100,0 g.

10g

Kapsle s propranololem 10 mg

Neselektivní betablokátor bez ISA. Používá se k léčbě tachyarytmie, hypertenze, tremoru, úzkostných stavů a jako profylaxe migrény. Vázán lékařským předpisem.

Propranololi hydrochlorium 10 mg v jedné kapsli Plnivo q. s. (obsahuje Lactosum monohydricum, Tritici amyllum, Silica coll. anhyd.)

100 cps

Kapsle s propranololem 20 mg

Neselektivní betablokátor bez ISA. Používá se k léčbě tachyarytmie, hypertenze, tremoru, úzkostných stavů a jako profylaxe migrény. Vázán lékařským předpisem.

Propranololi hydrochlorium 20 mg v jedné kapsli Plnivo q. s. (obsahuje Lactosum monohydricum, Tritici amyllum, Silica coll. anhyd.)

100g

Roztok s erythromycinem

Přípravek je určen k léčbě akné, zvláště k akné s převažujícími zánětlivými projevy. Náhrada za nedostupný přípravek Eryfluid. Přípravek je vázán lékařským předpisem.

Erythromycin 4,0 Acidum citricum monohydricum 0,33 Ethanolum 96 % 45,0 Aqua purificata ad 100,0 g.

20g

Nystatinová suspenze 50 000 m.j./g

Suspenze bez zápachu, žluté barvy. Používá se k profylaxi a léčbě slizničních kandidóz u kojenců, dětí i dospělých. Uchovává se při 2–8 °C. Chránit před světlem. Vázán lékařským předpisem.

Nystatinum 1 mil. m. j. Glycerol 85 % ad 20 g.

30 cps

Kapsle proti bolesti

Kombinované analgetikum. Užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti např. hlavy, svalů, zad, zubů atd. Přípravek je vázán lékařským předpisem. Lze ho považovat za možnou náhradu již zrušeného Alnagonu. *Upozornění: Přípravek může způsobovat euforii a závislost. Phenobarbital může být zdrojem lékových interakcí.*

Acidum acetylsalicylicum 11,4 Coffeinum 2,4 Phenobarbitalum 0,6 Codeini phosphas hemihydr. 0,55.

