



magistraliter
pharma

Mast s mupirocinem

Mast s mupirocinem 15g

Mast s mupirocinem lze využít k lokální léčbě primárních (např. impetigo, folikulitida) a sekundárních bakteriálních infekcí (např. infikované dermatózy, traumatické léze – odřeniny, bodnutí hmyzem, drobná poranění a popálení). Mast lze využít i profylakticky k zabránění bakteriálních kontaminací malých ran, odřenin a malých řezných ran a jiných ran. Mast lze považovat za alternativu dlouhodobě nedostupného Bactrobanu. Vázáno lékařským předpisem.

15g

Mast s mupirocinem



Složení: Mupirocinum 0,33 g Glycerolum 85% 1,0 g Macrogolum 300 8,0 g Macrogolum 4000 5,0 g Synderman ad 15,0 g

Exspirace: 3 měsíce

Mast s mupirocinem lze využít k lokální léčbě primárních (např. impetigo, folikulitida) a sekundárních bakteriálních infekcí (např. infikované dermatózy, traumatické léze – odřeniny, bodnutí hmyzem, drobná poranění a popálení). Mast lze využít i profylakticky k zabránění bakteriálních kontaminací malých ran, odřenin a malých řezných ran a jiných ran. Mast lze považovat za alternativu dlouhodobě nedostupného Bactrobanu.

Vázáno lékařským předpisem.