

Novinky

červen 2017





Septonexový zásyp 0,5%

40g

Zásyp s antiseptickým, antibakteriálním a slabě antimykotickým účinkem. Lze ho využít k ošetření drobných poranění kůže, nezávažných popálenin s možným rizikem infekce, po malých dermatochirurgických výkonech aj.

Carbethopendecini bromidum 0,2 g Lactosum monohydricum ad 40,0 g

Roztok Clindamycinu 1 %

30 g

Roztok s antibiotikem k léčbě acne vulgaris. Možná náhrada za nedostupný přípravek Dalacin T. Přípravek je vázán lékařským předpisem.

Clindamycini hydrochloridum, 0,33 g Aqua purificata 8,4 g Propylenglycolum 3,5 g Ethanolum 96% ad 30,0 g

Unguentum dexalenies 0,01 %

100g

Mast s obsahem kortikosteroidu s využitím na různé druhy ekzémů, dermatitid, pruritus aj. Výdej přípravku je vázán lékařským předpisem.

Uchovávat při teplotě 15 - 25°C. , unguatorový kelímek

Dexamethasoni acetat 0,01 g Propylenglycolum 0,99 g Ung. leniens ad 100,0 g

Kapsle s chloridem sodným 1,0 g

100cps

Kapsle obsahující chlorid sodný. Lze využít při hyponatrémii, při chronických renálních ztrátách.

Natrii chloridum 100,0 g Plnivo (Tritici amyllum, Lactosum monoh., Silica coll.anh.) q.s.

Patsa Lužova

100g

Pasta s antiseptickým a antiflogistickým účinkem. Lze využít při léčbě bérkových vředů.

Acidum salicylicum 3,0 g Acidum boricum 8,0 g Paraffinum liquidum 10,0 g Zinci oxydum 22,0 g Lavandulae etheroleum gtt V Vaselinum album ad 100,0 g

Kapsaicinová mast

250g

Mast určená k lokální aplikaci na malé plochy. Uplatňuje se především při artritidách, revmatismu, akutních či chronických zánětech kloubů, šlach aj. Mast působí derivačně, hřejivě a zároveň chladivě.

Levomentholum 2,5 g Methylis salicylas 15,0 g Camphora racemica 5,0 g Capsici tinktura 5,0 g Lavandulae etheroleum 1,25 g Ambiderman ad 250,0 g

Trimekainový roztok s dexamethasonem „Kouzelná voda“

50g

Znecitlivující roztok k výplachům úst, s širokým využitím na různé defekty v ústní dutině. Přípravek je vázán lékařským předpisem.

Trimecaini hydrochloridum 2,0 g Dexamethasoni acetat solutio 1% 2,0 g Aluminiumi acetotartratis solutio 5,0 g Ethanolum 60% 10,0 g Methylcellulosum 0,4 g Methylrosanilini chloridi solutio 0,5% 2 gtt Saccharinum natrium 0,02 g Menthae piperitae etheroleum 2 gtt Aqua conservans ad 50 g

Roztok rivanolu 0,1 %

 500g
1000g

Roztok rivanolu má adstringentní a poměrně slabý antimikrobiální účinek. Využívá se k obkladům například u bérkových vředů.

Ethacridini lactas monohydricus 0,5 g, Aqua purificata ad 500,0 g / Ethacridini lactas monohydricus 1,0 g, Aqua purificata ad 1000,0 g